



The European way(s) back to work

International Conference, 28 – 29 June 2007, Lucerne

Etude d'outcome dans les cliniques Suva

Prof. Dr. med. Olivier Dériaz

**Médecin adjoint, Chef du service de recherche
Clinique romande de réadaptation, Suisse**

Retour au travail des patients un an après avoir quitté les cliniques de réadaptation SUVA (CRR-RKB)

Olivier Dériaz, Pierluigi Ballabeni, Hanspeter
Gmünder, Charles Gobelet, Nikola Seichert
, François Luthi, Peter Erhart

Introduction

- Seule une fraction des patients répondent à un questionnaire envoyé à domicile.
- Souvent la population de **patients répondeurs** ne représente pas la **population totale** des patients interrogés (biais de sélection)


Introduction II

- Les cliniques SUVA ont fait une étude sur les **facteurs biopsychosociaux** qui prédisent le **retour au travail** après une hospitalisation.
- Le retour du travail était de 39% trois mois après la sortie de la clinique

Objectifs de l'étude d'outcome

- L'objectif de cette étude est d'évaluer si le retour au travail mesuré à partir d'un échantillon de patients ne souffre pas de biais de sélection.

Méthode




Méthode

Outil INTERMED: 20 questions posées par une infirmière sur le profil biopsychosocial du patient:

- biologique,
- psychologique,
- social et
- système de soins

Classification entre patients:

- Simples
- Complexes (avec « problèmes » biopsychosociaux)



Statistiques: régressions logistiques

Variable dépendante:

1) réponse au questionnaire après 1 an


ou

2) reprise du travail après un an


Variables indépendantes:

- Age,
- sexe,
- situation familiale,
- Complexité INTERMED
- langue maternelle,
- co-morbidités psychiatriques,
- alcoolisme, autres addictions,
- co-morbidités somatiques



Résultats




Résultats




Résultats: régressions logistiques




Résultats: résumé




Résultats: langue maternelle et taux de réponse



Résultats: taux de réponse et reprise du travail



Discussion



Hypothèse: Pour une catégorie de langue, le taux de reprise de travail est le même chez les répondants et les non répondants.

Reprise du travail « ajustée »: 41% au lieu de 45%

Conclusions

- La langue maternelle française et
- Une complexité biopsychosociale basse
prédisent:
 - Un meilleur retour au travail
 - Un meilleur taux de réponse
- Le taux de reprise de travail, calculé au moyen d'un questionnaire, est surestimé chez nos patients

Merci de votre attention